


Ueber

PHOCOMELIE.



Inaugural - Dissertation

zur Erlangung der Doctorwürde

unter dem Präsidium

des Herrn Obermedicinalrathes Professor

Dr. von Hecker


**der medicinischen Fakultät
zu München**

vorgelegt

von

Franz Michael Gerl,

approb. Arzt aus Landshut.



München 1879.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn in München.

Ueber

PHOCOMELIE.



Inaugural - Dissertation

zur Erlangung der Doctorwürde

unter dem Präsidium

des Herrn Obermedicinalrathes Professor

Dr. von Hecker

der medicinischen Fakultät
zu München

vorgelegt

von

Franz Michael Gerl,

approb. Arzt aus Landshut.



München 1879.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn in München.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Phocomelie

(Robbengliederbildung.)

Unter Phocomelie (φώκη Robbe, μέλος Glied) versteht man eine Mißbildungsform des Menschen, bei der Hände und Füße sehr nahe oder unmittelbar an Schulter und Hüfte ansitzen, indem die großen Röhrenknochen der Arme und Beine entweder ganz fehlen oder unter einander zu einem kurzen Rudiment verschmolzen oder nur bedeutend verkürzt sind.

Den Namen Phocomelie gebraucht zuerst *Js. Geoffroy St. Hilaire* in seinem großen Werke über Mißbildungen bei Menschen und Thieren*) wegen der Aehnlichkeit dieser Extremitätenanomalie mit dem normalen Bau der Gliedmaßen der Robbenfamilie (Phocina).

Durch Schulter und Hüfte sind unsere Gliedmaßen mit dem Rumpfe verbunden, Hände und Füße wiederum durch zwei Zwischenstücke Ober-Unterarm und Ober-Unterschenkel mit Schulter und Hüfte. Das ist auch bei den meisten höheren Thieren der Fall. Bei denen aber, welche sich vorzugsweise im Wasser aufhalten, sieht man die zwei Zwischenstücke immer kürzer und nutzloser werden, selbst rudimentär, und manchmal ganz fehlen. Die Endstücke nähern sich immer mehr dem Rumpfe und scheinen hier

*) Histoire des anomalies de l'organisation chez l'homme et les animaux. Paris 1836, Tom. II, p. 208.

oft direkt zu entspringen, sei es, daß die Zwischenstücke wirklich in großer Ausdehnung fehlen, wie bei den Fischen, oder daß sie auf einen sehr kleinen Theil reducirt sind und unter der Haut verdeckt liegen, wie bei den Wallen und Robben. So ist es auch normal bei einigen Erdthieren, wie beim Maulwurf und überhaupt bei der Familie der Würfe (*Talpina*).*)

Die Phocomelie findet sich meist symmetrisch vor, also in der Art, daß immer die beiden oberen Extremitäten, oder die beiden unteren, oder alle vier gleichzeitig davon betroffen sind. *J. G. St. Hilaire* gibt zwar die Möglichkeit zu, daß sich die Phocomelie auch asymmetrisch, einseitig entwickeln könne, aber er sagt hierbei gleichzeitig, daß ihm ein authentischer Fall einer derartigen Modifikation von Phocomelie nicht bekannt sei.

Aber nicht bloß in Bezug auf die Anzahl der von Phocomelie betroffenen Extremitäten kann man innerhalb dieser einen Unterschied machen, sondern auch in Bezug auf das Verhalten, welches die Zwischentheile zwischen Schulter und Hand, Hüfte und Fuß darbieten. Die Röhrenknochen des Ober- und Unterarms, des Ober- und Unterschenkels können 1) ganz fehlen, was eigentlich bei den Robben nicht vorkommt, indem hier wirkliche, aber sehr kurze und bis zum Hand- und Fußgelenke durch die Haut verhüllte Gliedmaßen vorhanden sind; aber jedenfalls stimmt gerade diese seltenste Art wegen des äußern Ansehens am meisten für den Namen »Phocomelie«, wenn sich auch keine anatomischen Gründe dafür geltend machen lassen, 2) unter einander zu einem einzigen und zwar kürzerem Stücke verschmolzen, 3) nur sehr verkürzt sein.

Der Phocomelus, nach *Förster***) eigentlich eine Form des Peromelus, unterscheidet sich von diesem dadurch, daß

*) Trofchel, Handbuch der Zoologie, Berlin 1871. S. 55.

**) Die Mißbildungen des Menschen von A. Förster. Jena 1861. S. 64.

bei letzterem sämtliche Extremitäten in einer untypischen Weise defekt und mißgestaltet sind, besonders auch die Hände und Füße mit den Fingern und Zehen, während alle letzteren gerade beim Phocomelus gewöhnlich wohlgebildet sind. Der Micromelus wiederum hingegen zeigt nirgends einen Defekt innerhalb der Extremitäten, sondern nur eine abnorme Kleinheit derselben, ist gewöhnlich auch asymmetrisch oder in den verschiedenen Extremitäten in ungleichem Grade entwickelt.

Bei vollendet gebildeten Händen und Füßen drückt es den höchsten Grad von Nichtentwicklung der Extremitäten aus, wenn die beiden ersten Glieder fehlen. Es scheint häufiger zu sein, daß sich nur das eine nicht entwickelt und zwar gilt dieses besonders für den Unterarm und Unterschenkel.*)

In Bezug auf die functionelle Leistungsfähigkeit der von Phocomelie betroffenen Extremitäten liegen zwei, vom physiologischen Standpunkte aus betrachtet, sehr interessante Berichte vor.

*Duméril***) erzählt von einem Venetianer, Namens *Marco Catozze*, genannt der kleine Zwerg von Venedig, der an allen 4 Extremitäten die ausgesprochenste Phocomelie zeigte, ein Alter von 62 Jahren erreichte und im Jahre 1800 zu Paris starb; er hatte sein Leben damit zugebracht, daß er seine Person in allen Hauptstädten Europas zur Schau stellte. Er konnte sich aufrecht halten und sogar gehen; hie und da legte er selbst einen Weg von beinahe $\frac{1}{4}$ Meile zurück. Wenn er ermüdete, brauchte er nur ein wenig auf den Sitzknorren auszuruhen, um sich zu neuen Anstrengungen befähigt zu machen. Mit dem Auslangen der Hände verhielt es sich wie mit dem Ausfahren der Füße: es war für ihn ebenso leicht; nur zu kurz waren

*) J. Fr. Meckel. Path. Anat. Leipzig 1812. B I. S. 748.

**) Bull. de la Soc. Philomatique t. III (an XI) p. 122.

ihm feine Arme und er hatte sich deshalb selbst ein eigenes Instrument construirt, mit dem er weiter ausgreifen konnte; überhaupt war er ein lebhafter und befähigter Kopf; er sprach und schrieb vier Sprachen.

Bei der Sektion fand *Duméril* die Clavicula fast ganz gerade, nur sehr dick an der Extremitas sternalis. Acromion und Processus coracoideus waren verlängert. Ober- und Unterarmknochen fehlten, die Hand, deren Phalangen einer vollständigen Extension nicht fähig waren, artikulierte mit dem Schulterblatte durch einen Carpalknochen.

Die Sehnen der Muskel, welche sonst den Kopf des humerus umgeben, vereinigten sich zu einer Art Beutel mit einer faserigen Kapfel um den kleinen Kopf des Schulterblattes, so daß diese Muskeln keine Bewegung auslösen konnten. Der Pectoralis major, latissimus dorsi, teres major und deltoideus bildeten eine gemeinschaftliche Sehne mit Insertion am Carpus. Von dieser Sehne entsprang für jeden Finger ein Flexor und Extensor. Auch sehr rudimentäre Muskeln des Vorderarms waren vorhanden.

An den unteren Extremitäten fand man beiderseits den Kopf des Femur und die zwei Trochanter, dann die Tibia ohne jeden näheren Zusammenhang mit dem Femur, aber mit dem Fusse artikulierend; die Zehen waren krumm. Fast alle Muskel der unteren Extremität waren rudimentär; Gastrocnemius und Soleus inserierten am calcaneus; die Flexoren und Extensoren der Zehen entsprangen vom Hüftbein, von Femur und Tibia.

Die Blutgefäße und Nerven der Extremitäten waren ungewöhnlich klein. Am Schädel fehlte die Verbindung zwischen dem Jochfortsatz der Schläfenbeine und dem Jochbein, wie bei dem von *Bradyp**) beschriebenen Cycloptenschädel, und beiderseits der m. masseter.

*) Vrolik, Tabulae ad illustrandam embryogonesin. Amsterdam 1849. Tab. LIII. Fig. 2.

Der andere kürzere Bericht stammt von *Dumas**), worin angegeben wird, daß ein Mann mit Phocomelie an den unteren Extremitäten eine bedeutende Kunstfertigkeit im Springen an den Tag legte, wodurch er sich überhaupt feinen Lebensunterhalt verdiente. In diesem Falle war Tibia und Fibula unter sich und mit einem Rudiment des Femur verschmolzen; die Phocomelie war also nicht so hochgradig als im ersteren Falle.

Ueber die Muskeln erwähnt *Dumas* gar nichts; hierin zeichnet sich *Duméril's* Bericht vor allen anderen aus.

Aus den angeführten Beispielen ersieht man jedenfalls, wie sich, wenigstens durch Jahre lang fortgesetzte Uebung auch ein so bedeutender Naturfehler wie die Phocomelie in Rücksicht auf funktionelle Leistungsfähigkeit großen Theils ausgleichen läßt. Daß der Phocomelus auch in psychischer Beziehung, in Ausbildung der geistigen Fähigkeiten eines Menschen überhaupt nicht zurück zu bleiben brauche, ergibt besonders der Fall *Duméril's*.

In chirurgischer Beziehung verdient ein von *Farges***) erörterter Fall von Phocomelie bei einem 6 Monate alten Mädchen Beachtung.

Die Phocomelie war feltfamerweise asymmetrisch, indem sie sich nur auf die rechte untere Extremität bezog, welche bei der Geburt des Oberschenkels gänzlich zu entbehren schien. Aber ein harter Vorsprung an der Plica inguinalis liefs ein Knie erkennen und durch Ziehen am Unterschenkel brachte man einen rudimentären Oberschenkel von 4—5 cm. Länge mit nach hinten und außen gerichteten femur hervor. Kniekehle und Afterfalte waren verschmolzen, das Gelenk zeigte einige Beweglichkeit, aber die Flexion war andauernd, doch gelang es allmählig, eine vollständige Ex-

*) Princ. de Physiologie, t. III, p. 165 — et dans le Recueil périod. de la Soc. de Méd. de Paris, t. X, p. 30.

**) Phocomélie du membre abdominal droite chez une petite fille de 6 mois par Dr. G. Farges. Gaz. méd. 1872. Nr. 26. p. 314.

tenſion zu erreichen und das Bein gerade zu ſtellen. Man konſtruirte einen eigenen Apparat zur Ausübung eines beſtändigen Zuges auf den rechten Fuß, der mit ſeiner Sohle bei vollſtändiger Extenſion nicht über die Kniekehle der linken Extremität hinausging. Zur genauen Anfertigung des Apparates brauchte man einen Abguß nicht bloß der Extremität, ſondern auch des Theiles des Unterkörpers, wo die Hauptſchiene ihren Stützpunkt finden ſollte. Der Abguß wurde unter Chloroformnarkoſe genommen. Von dem Apparate hoffte man eine dauernde Geradſtellung des Fußes, durch die Krümmungsausgleichung der Arterien deſſelben eine beſſere Ernährung und vielleicht ſelbſt eine geringe Abnahme der Längendifferenz.

Was die Eltern des Kindes anbelangt, war kein Mitglied der väterlichen oder mütterlichen Familie irgend wie mißgeſtaltet; Erblichkeit lag alſo hier keine vor.

Aus dem Falle *Farges* erſieht man, wie es unter Umständen möglich iſt, durch Kunſthilfe einen derartig bedeutenden Fehler wie Phocomelie herabzumindern.

In geburtshilflicher Hinſicht können nach *Hohl**) Mangel und Kleinheit der Extremitäten, mit welcher letzterer wir es bei Phocomelie zu thun haben, nicht leicht einen ſtörenden Einfluß auf die Geburt ausüben. Eigenthümlich geſtaltet ſich die Sache in Bezug auf die oft, wie wir bei der Aetiologie noch ſehen werden, mit Phocomelie verbundene Hydrocephalie. Dieſe wurde von jeher unter die Urfachen ſchwerer Geburten gerechnet. Ein geburtserſchwerendes Moment bildet ſie hauptſächlich nur dann, wenn ſie ſehr hochgradig oder in Verbindung iſt mit hartem Schädel-dache, mit verknorpelten oder beinahe verknöcherten Fontanellen. Die Aetiologie aber wird zeigen, daß ſie das gerade bei Phocomelie nicht iſt; hier haben oft nicht ein-

*) Die Geburten mißgeſtalteter, kranker und todter Kinder. Halle 1850. S. 146; 252.

mal die eigentlichen Schädelknochen die richtige knöcherne Consistenz, viel weniger zeigen die Fontanellen nur den Anfang zu einer Verknorpelung oder gar Verknöcherung. Da also die Schädelknochen zum mindesten nicht unnachgiebig, oft aber sehr weich sind, sieht man bei mittelmäßiger Hydrocephalie von einer Gefahr für die Mutter mehr ab und fragt sich eher, ob die Frucht nicht geschädigt wird? Dafs dieses möglich, dafür spricht Präparat 192 der Sammlung im hiesigen Gebärhause. Es ist ein in erster Fußlage geborener (16. Juni 1870), männlicher Phocomelus geringen Grades nicht ganz 8 Monate alt, von 1170 gr. Gewicht, 26 cm. Länge. Nach dem Erscheinen des vorliegenden kleinen Fußes schritt man, da das Kind Zuckungen machte, zur Extraktion desselben. Alles nahm einen sehr leichten Verlauf bis auf die Entwicklung des Kopfes. Man ging mit der linken Hand in die Mundhöhle ein, während die rechte sich auf dem Nacken festsetzte, und machte einen kräftigen Zug nach abwärts: Hierbei aber fühlte man, wie der Rumpf herabgezogen wurde, ohne dafs der Kopf folgte, und beim Nachlass des Zuges auch Hals und Rumpf wieder zurücktrat. Sogleich dachte man an Hydrocephalus. Die Entwicklung des Kopfes gelang rein manuell, ohne Zuhilfenahme eines Instrumentes. Nun aber zeigte sich, dafs am Schädel eine Continuitätstrennung stattgefunden hatte. Das Kind hatte noch Herzschlag, starb aber bald darauf.

Die Befichtigung des Präparates ergibt folgendes: Der Rifs des Cranium geht von einem Ohr über die Gegend der Protub. occip. ext. zum andern. Das kleine Gehirn liegt offen zu Tage. Das Cranium selbst ist meist häutig, an den Punkten, von wo die Ossification ausgeht, mehr knorplich, von einer Verknöcherung des Daches ist nirgends etwas zu merken.

Die Mutter hatte aufer Verlängerung der Geburtsperiode keinen Nachtheil gelitten. Man kann also über-

haupt annehmen, daß die Phocomelie, selbst wenn sie sich in Verbindung mit Hydrocephalie befindet und diese nicht zu hochgradig ist, bei der erwähnten Beschaffenheit der Schädelknochen der Mutter keinen bedeutenden Schaden zufügen kann; auch das Kind kann gewiß nur in sehr seltenen Fällen so bedeutenden Nachtheil wie oben nehmen.

Nachdem wir nun die Phocomelie in ihren äußeren Erscheinungen und Wirkungen kennen gelernt, gelangen wir zur Hauptaufgabe, zur Ermittlung der Urfachen derselben. Als Uebergang und zu einer theilweisen Begründung der Aethiologie der Phocomelie diene hier die Beschreibung dreier Präparate der hiesigen geburtsh. Sammlung, welche verschiedene Grade von Phocomelie darstellen.

Fall I. (Präparat 19) zeigt eine Phocomelie mittleren Grades. Es ist ein weiblicher Fötus, geboren in zweiter Stirnlage am 1. Oktober 1856. Die Mutter hatte Anfangs Februar zum letztenmale menstruirt, wonach also die Frucht nicht ganz 8 Monate alt ist. Die Geburt selbst war ohne Nachtheil für die Mutter erfolgt.

Das Gewicht des Fötus beträgt 3600 gr., die Körperlänge vom Scheitel bis anus externus (die unteren Extremitäten lassen sich ohne Gewalt nicht gerade stellen) 21 cm., der Leibesumfang in der Gegend des Nabels 31 cm. Der Kopf nimmt fast die Hälfte der Körperlänge ein. Die einzelnen Maße desselben sind:

	Centim.	bei reifen Kind n. Schröder
Kopfumfang	37	normal 34 $\frac{1}{2}$
diameter recta	12	11 $\frac{3}{4}$
„ transversa major	10	9 $\frac{1}{2}$
„ „ minor	8 $\frac{1}{2}$	8
„ obliqua	11	13 $\frac{1}{2}$
„ verticalis	9	9 $\frac{1}{2}$ —10

Die Augenlider verstärken durch ihre Schwellung, welche die Augen ganz verdeckt, den Eindruck des Gedenkenfeins des Gesichtes, das Stirnbein wölbt sich nach

vorne zu, die Gegend, wo beim Erwachsenen die Tubera frontalia sind, erscheint in Folge dessen beiderseits eingefunken und die Nasenbeine wie eingedrückt. Der Geburt in Stirnlage entspricht die aufsen noch sichtbare Kopfgeschwulst mit Abschürfungen der Epidermis. Die beiden Stirnbeine zeigen eine festere Consistenz als die Scheitel- und Schläfebeine und das Hinterhauptsbein. Große und kleine Fontanelle sind proportional der Größe des Kopfes. Die Nase ist ganz platt, ihr Niveau ist unter dem der Wange. Der Knorpel am Septum liegt höher als die Seitenflügel. Der eingefunkenen Nase entspricht die bis an sie streifende Oberlippe, deren Wulst über die Nase emporragt. Die Unterlippe ist in Folge dessen nur halb so breit als die Oberlippe, der Mund überhaupt so klein, daß man kaum den kleinen Finger einführen kann. Hals scheint fast keiner vorhanden zu sein. Ein Längsschnitt vom Kinne bis zur Symphyse läßt die inneren Organe normal erkennen. Die großen Schamlippen klaffen noch auseinander, so daß man auch die kleinen sieht.

Die oberen Extremitäten messen beide von der Schulterhöhe bis Mittelfingerpitze 8 cm., davon die Hand 3 cm.; es bleiben also für das ganz gerade (ohne Ellenbogengelenk) erscheinende Zwischenstück 5 cm.

Die unteren Extremitäten zeigen im Verhältniß zu den oberen einen etwas höheren Grad von Phocomelie. Selbst vom Anus externus bis zur Spitze der zweiten Zehe ergeben sich nur 9 cm., davon treffen 3 cm. auf den Fuß (vom Sprunggelenk bis zur Spitze der zweiten Zehe).

Auch hier erscheint der Theil zwischen Hüfte und Fuß gerade, kein Knie oder Kniegelenk ist wahrnehmbar.

Während die Hände gerade nach abwärts sehen, sind die Plantarflächen der Füße gegen die Bauchseite gekehrt. Die Nägel sind an den Fingern und Zehen nur minimal entwickelt, neben anderen ein Zeichen für die Unreife des

Kindes. Um so mehr spricht der den normalen Umfang überschreitende Kopf für Hydrocephalie.

Alle Extremitäten fühlen sich weich an und lassen sich leicht biegen in allen Richtungen; in letzterer Beziehung stimmt dieser Fall mit jenem *Vroliks**) («quod debeo Sandi-fortio») überein, welchen er als Rachitis congenita gelten läßt.

Fall II. (Präparat 140) zeigt einen hohen Grad von Phocomelie sowohl der oberen als der unteren Extremitäten. Es ist ein männlicher 6—7 monatlicher Fötus mit einem Gewicht von 700 gr. Die Körperlänge vom Scheitel bis anus externus beträgt 20 cm., der Brustumfang unter der oberen Extremität 22 cm. (der Leib ver schmächtigt sich nach unten zu.) Die Masse des Kopfes:

Kopfumfang	27 cm.
diam. rect.	9
diam. transv. maj.	7 $\frac{1}{2}$
diam. transv. min.	6 $\frac{1}{2}$
diam. obl.	9
diam. vert.	7 $\frac{1}{2}$

Der Kopf nimmt ein dem übrigen Körper fast gleich großes Volumen ein. Das kommt aber nicht von seiner Höhe, sondern von seiner bedeutenden Ausdehnung nach hinten; denkt man sich durch eine vom Mittelpunkt des for occip. magn. in den sagittalen Mittelpunkt des Kopfes gelegte Ebene diesen in eine Vorder- und Hinterhälfte getheilt, so ist die letztere $\frac{1}{3}$ größer als erstere. Geringer Hydrocephalus ist vorhanden.

Das Cranium zeigt auf Druck normale Consistenz. Beiderseits findet sich vollständige Atresie der Gehörgänge; nur die Ohrläppchen sind angedeutet. Die Nase ist platt; ein Schlitz der Oberlippe rechterseits setzt sich in das Nasenloch dieser Seite hinein fort; mit der linken Seite ist die scheinbare Zwischenlippe mehr verbunden. Das Kinn

*) Tab. ad. ill. embr. Tab. XCI. Fig. 3.

tritt sehr zurück; um so mehr erscheint der Hals vorne verlängert. Brust und Anfangstheil des Abdomen sind stark nach vorne ausgewölbt, dagegen das Becken sehr nach hinten, so dafs der kleine Penis fast den Nabel berührt. Die glans befindet sich ganz in dem leicht reponirbaren praeputium. Das Scrotum ist sehr klein und nur flächenhaft; die Länge des ganzen Gliedes beträgt nicht mehr als 1 cm. Verhältnismäfsig breit dagegen erscheint das Perineum; die Hinterbacken sind so abgeflacht, dafs man glaubt, es seien keine vorhanden. Ueber 1 cm. vom an. ext. entfernt nach hinten und aufwärts liegen die Anfangswirbel des Steifsbeins fast offen zu Tage. Die Beckenbreite tritt gegen die Schulterbreite sehr zurück, indem sich der Rumpf nach abwärts immermehr verschmälert.

Merkwürdig verhalten sich die Extremitäten; im Zusammenhang mit den übrigen Erscheinungen machen sie sofort den Eindruck einer ausgesprochenen Phocomelie.

Die obere rechte Extremität mit ihrer nur drei Finger zeigenden Hand sieht aus wie eine Flosse; sie misst bis zur Spitze des ersten Fingers nur 7 cm.; davon treffen schon 3 cm. auf die Hand allein. Das übrige 4 cm. lange Stück läfst einen sehr festen, unbiegsamen Röhrenknochen durchfühlen; keine Spur von einem Ellenbogengelenk ist ausen bemerkbar.

Gleiche Mafsverhältnisse zeigt auch die linke obere Extremität; ebenso hat ihre Hand nur Daumen und zwei Finger, welche sich mit ihren Metakarpalknochen bis zur Handwurzel als isolirt palpiren lassen.

Die rechte untere Extremität liegt mit dem Sprunggelenke des Fufses dem Becken an und läfst nur eine Messung des Fufses zu; ein Röhrenknochen ist durch Palpiren nicht zu finden. Der Fuß misst vom calcaneus bis zur Spitze der grofsen Zehe $4\frac{1}{2}$ cm. Die zweite Zehe fehlt gänzlich, die dritte und vierte ist zu einer verschmolzen, die kleine wohlgebildet. Wölbung des Fufses ist keine

vorhanden, die von einander gerichteten Zehen verbreitern den Fuß nach vorne sehr.

Die linke untere Extremität läßt einen sehr kurzen, harten Verbindungsknochen zwischen Becken und Fuß durchfühlen, der sich aber gänzlich unter der Haut der Hüfte befindet.

Die Maßverhältnisse sind dieselben wie rechts; der Fuß hingegen ist wohlgebildeter; er zeigt 5 Zehen und auch eine entsprechende Wölbung. Dadurch, daß die Plantarflächen beider Füße nach außen sehen und die Dorsalflächen dem Abdomen anliegen, wird in Verbindung mit dem nach rückwärts gezogenen Kopf der Eindruck hervorgerufen als dienten die Füße wie Ruderflossen zum Schwimmen, wie überhaupt der Fötus eine ganz derartige Haltung einnimmt.

Fall III. (Präparat 230) zeigt eine bedeutende Phocomelie der oberen Extremitäten, dagegen eine sehr wenig ausgeprägte der unteren. Es ist ein männlicher Fötus von 1550 gr. Gewicht, ungefähr 9 Monate alt; er mißt vom Scheitel bis anus externus 26 cm. Die Maße des Kopfes:

Kopfumfang	33,5 cm.
diam. rect.	11
diam. transv. maj.	9
diam. transv. min.	7,5
diam. obl.	11,5
diam. vert.	9,5

Die Consistenz der Knochen des Schädeldaches ist überall von normaler Beschaffenheit. Auch die Fontanellen zeigen die gewöhnliche Größe. In Verbindung mit den erwähnten Maßen, welche unter dem Normalen sind und der noch nicht vollständigen Reife der Frucht entsprechen, läßt dieses darauf schließen, daß hier kein Hydrocephalus vorhanden ist, obwohl der Kopf ein ziemlich voluminöses Ansehen gewährt. Sehr sonderbar erscheint das Gesicht; es ist nämlich der Mitteltheil des Oberkiefers in keiner

anderen Verbindung als mit dem Nasenscheidewandknorpel; er hängt als ein unförmliches Klümpchen von der Nasenspitze herunter. Am Thorax und Abdomen findet sich nichts Bemerkenswerthes.

Die obere rechte Extremität misst vom Schultergelenk bis Mittelfingerspitze 7,5 cm.; davon treffen auf die Hand 3,5 cm., also fast die Hälfte der ganzen Extremität; diese entspricht in ihrer Dicke so ziemlich der Gröfse des Fötus, sonst aber erscheint sie unförmlich. Der die Hand mit dem Schultergelenk verbindende Knochen ist von mittlerer Consistenz. Kein Ellenbogengelenk ist ausen bemerkbar. Hiemit und mit den Mafsverhältnissen stimmt die obere linke Extremität überein. Hingegen zeigt ihre Hand nur Daumen und 3 Finger, während die Anzahl der Phalangen der rechten Hand eine normale ist. Der Daumen der linken Hand sieht aus wie ein Finger. Die Breite jeder Hand ist nicht gröfser als ein an verschiedenen Stellen genommener Durchmesser der übrigen Extremität.

Beide unteren Extremitäten, welche vom an. ext. bis zur Spitze der 2. Zehe 13 cm messen (davon treffen 3 cm auf die Entfernung des Sprunggelenkes von der Zehenspitze) sind nur etwas kleiner als normal; auch ist Knie und Kniegelenk deutlich vorhanden. Ober- und Unterschenkel verhalten sich proportional der Gröfse der Extremität, deren Knochen eine normale und daher im Vergleich zu denen der oberen Extremität stärkere Consistenz haben. Jeder Fuß stellt einen ausgeprägten pes varus dar; in Folge dessen kreuzen sich auch die Beine des Phocomelus übereinander. —

Wollen wir nun über die Urfachen der Phocomelie nur einigermaßen Aufschluß haben, müssen wir zuvor auch noch die Entwicklungsgeichte der Gliedmaßen betrachten.

Wenn im Embryoleben bereits Kopf und Rumpf in ihrer inneren Anlage getrennt sind, ist in diesem Stadium

der Entwicklung noch keine Andeutung für Extremitäten vorhanden. Erst gegen Ende des ersten Monats treten aus den Seitenplatten rundliche Höcker hervor, welche immermehr vorspringen und einen inneren schmäleren und äusseren breiteren Theil erkennen lassen. Im zweiten Monate scheiden sich die Extremitäten deutlich in ihre 3 Theile. Nach *Kölliker* *) entstehen die Gefässe durch Hereinwachsen der schon vorhandenen Kanäle unter Mitbetheiligung gewisser Elemente der Extremitätenanlage selbst, ebenso bilden sich die Nerven von den Stämmen der Spinalnerven aus in die Gliedmassen hinein, während die Muskeln wie die Extremitätenknochen in jener Proliferation selbst entstehen. Die Gelenke erscheinen bei 6—8 Wochen alten Embryonen nach dem ersten Auftreten der Knorpel. Bei 4 Monate alten Embryonen sind alle Gelenke bis auf die der letzten Phalangen angelegt. Mit einziger Ausnahme der Clavicula werden alle Extremitätenknochen als ächte, hyaline Knorpel vorgebildet. Sind die knorpeligen Extremitätentheile einmal gebildet, so wachsen sie bald mehr bald weniger lang in diesem Zustande fort, bevor die Verknöcherung beginnt. Der Humerus ossifizirt in der 8. oder 9. Woche in der Diaphyse. Bei der Geburt sind die beiden Epiphysen noch vollkommen knorpelig, die Diaphyse verknöchert. Ulna und Radius ossifiziren im 3. Monate des Embryo in der Diaphyse, die Epiphysen finden sich noch lange nach der Geburt knorpelig. Die Theile des Carpus bleiben meist bis zur Geburt knorpelig, dagegen verknöchern die des Metacarpus in ihren Diaphysen schon im 4. Monat, um die nämliche Zeit auch die Phalangen der Finger.

Der Femur erhält seinen Diaphysenkern am Ende des zweiten Monats. Die reife Frucht zeigt einen Kern in der unteren Epiphyse und erst nach der Geburt, aber bald, tritt einer im caput femoris auf. Tibia und Fibula beginnen

*) Entwicklungsgegeschichte des Menschen und der höheren Thiere. Leipzig 1879. S. 489.

ihre Ossifikation in der Diaphyse am Anfange des 3. Monats. Die Patella zeigt sich schon im 2. Monat als Knorpel, erhält jedoch ihren Kern erst im 1.—3. Jahre. Vom Tarsus sind nur calcaneus und talus bei der Geburt meist verknöchert, alle übrigen Theile verknöchern erst später, Metatarsus und die Phalangen der Zehen in ihren Diaphysen im Allgemeinen etwas später, als die Mittelkandknochen und die Fingerglieder, also gegen Ende des 4. Monats.

Frägt man sich, in welchem Abschnitte des Embryonallebens es möglich sei, die Erscheinungen der Phocomelie zuerst zu beobachten, so wird dies zu einer Zeit sein, wo eine Dreitheilung der Extremität eintritt, das ist, wie oben erwähnt, im zweiten Monate des Embryo.

Beim Phocomelus sind meistens Hände und Füße wohl ausgebildet in Bezug auf Finger und Zehen, wenn auch in verkleinertem Mafsstabe, aber sie sind doch immer Menschenhände, Menschenfüße. Diese Betrachtung allein schon tritt einem etwa sich aufdrängenden Gedanken entgegen, die Phocomelie durch Atavismus (nur mit Bezug auf die Extremitäten und bei einiger Aehnlichkeit derselben mit Robbengliedern wie bei Präparat 140 [II. F.]) erklären zu wollen; auch liegen selbst nach *Häckel**) die Ruderfüßer (Pinnipedia), zu welchen die Robbe gehört, auferhalb der direkten Stammesgenealogie des Menschen. Für psychische Affektion, das sogenannte Verfehen, liegt, abgesehen von den falschen Vorstellungen, die man früher daran knüpfte, überhaupt keine Möglichkeit vor. Erblichkeit in dem Sinne, dafs Vater oder Mutter ihre Phocomelie auf ihre Kinder übertragen, läfst sich für keinen Fall in der Literatur nachweisen. Im Gegentheil, *Hecker**) erwähnt, dafs bei einer Frau mit kurzen Extremitäten, welche durch Kaiserschnitt von Zwillingen entbunden wurde, diese vollkommen ausgebildet und normal waren. Ueberhaupt vererben sich

*) Anthropogenie. Leipzig 1874. Tab. 19.

*) Klinik der Geburtskunde. Leipzig 1864. Bd. II. S. 73.

hochgradige Bildungsfehler nicht leicht, indem die ihnen zu Grunde liegende Ursache eher dem Fortleben der Generation ein Ende setzt. Nehmen wir nun irgend eine Störung an, sei es eine krankhafte oder mechanische, unter welcher beiden Umständen ein Einfluß der Eltern noch immer möglich ist, so müssen wir als früheste Zeit der Entstehung der Mißbildung den zweiten Monat des Embryo annehmen, sonst wäre an eine vollkommene Ausbildung der Hände oder Füße nicht zu denken; träte die Störung früher ein, so würde sie eher zu einem Peromelus führen, zu einem Defekt von Händen und Füßen oder der ganzen Extremität. Betrachten wir zuerst die krankhaften Einflüsse, welche den Embryo in dieser frühen Zeit in seiner Entwicklung hindern können. Vor allem begegnet uns hier die Hydrocephalie.

*Bischoff**) nun, welcher den Phocomelus zu der 1. Klasse seines Systems rechnet (»Mißbildungen, denen zur Realisation der Idee ihrer Gattung etwas fehlt«) sagt: Der Phocomelus »ist auch eine Hemmungsbildung, oft vielleicht durch wasserfüchtige Zerstörung des Gehirns und Rückenmarks bedingt.«

Dafür stimmt ein von *Bouchard***) beschriebener Fall von Hydrocephalie, bei dem außer Wolfsrachen und Spalte des Unterleibes auch Kürze der Extremitäten beobachtet wurde. Dafs die Hydrocephalie überhaupt einen bedeutenden schädigenden Einfluß auf die Entwicklung des Körpers gewinnen kann, zeigt auch ein von *Bordenave***) beschriebener siebenmonatlicher, hydrocephalischer Fötus, bei dem die Extremitäten viel zu kurz waren und alle Knochen bis auf die Wirbel eine knorpelige Beschaffenheit hatten.

Hydrocephalie ist auch als Ursache anzunehmen in

*) Wagner's Handwörterbuch der Physiologie. 1842. 1. B. S. 903.

**) Eph. Nat. Cur. dec. I. an III. obs. 13.

**) Mém. prés. t. IV. p. 545.

einem von *Walter**) beschriebenen Falle, der zugleich auch die Möglichkeit des Vorkommens von Zwillingen bei Phocomelie beweist; bei jedem Fötus war das Hinterhaupt in einen grossen Sack ausgedehnt; die oberen und unteren Extremitäten hatten kaum den vierten Theil der gewöhnlichen Länge; ausserdem waren die Füße nach innen gekrümmt.

Für Hydrocephalie als ätiologisches Moment spricht auch die vergleichende pathologische Anatomie; die Phocomelie wurde eben auch an Thieren beobachtet. *Js. G. St. Hilaire***), der sich in seinem Werke über Mißbildungen nicht bloß mit denen von Menschen, sondern auch mit Mißbildungen von Thieren beschäftigt, erwähnt einen Kalbsfötus mit ausnehmender Kürze der 4 Extremitäten und mit hydrocephalischem Kopfe; noch an 2 anderen Kalbsfötus beobachtete er dieselben Erscheinungen; auch an einem Fohlen; hier fand er aber den Kopf normal, was er, wie er sagt, bei den Thieren als das einzige Beispiel von Phocomelie ohne Complication mit Hydrocephalie anführen kann.

Analoges findet sich in *G. Jaeger's* Beschreibung zweier Zwergkälber.***)

Defungeeachtet kommen Fälle vor, welche sich nicht auf Hydrocephalus zurückführen lassen. *Hecker*****) beschrieb einen gemeinfam mit Buhl unterfuchten fünfmonatlichen Embryo (Präparat 32) mit Phocomelie mittleren Grades; hier lag kein Hydrocephalus vor. Aber das ganze Knochen-system zeigte ein auffallendes Verhalten, das sich besonders durch die Vergleichung des Durchschnittes dieses Embryo mit dem eines normalen gleichaltrigen zu erkennen gab; beim normalen war schon in jedem Wirbelkörper ein

*) Mus. anat. 1805. p. 123.

**) p. 212.

***) Meckel's Archiv für Anatomie und Physiologie. 1827. S. 586.

****) Klinik d. Geburtsk. II. B. S. 89. Tafel III u. IV.

Knochenkern deutlich zu erkennen, im Hinterhauptsbein, Keilbein, Oberkiefer, Unterkiefer war die Verknöcherung bereits beträchtlich vorgeschritten; hingegen zeigten sich beim *Phocomelus* nur Spuren von Verknöcherung, die ganze Wirbelfäule war bis auf einen Ossifikationspunkt im Keilbein knorpelig. Durchschnitte der Extremitäten ergaben auffallende Mafsverhältnisse der Knochensubstanz des *Phocomelus* gegenüber der des normalen Embryo. Von dem 4,6 cm langen Oberschenkel des normalen Embryo waren 3,3 cm verknöchert, dagegen von dem 2,2 cm langen Oberschenkel des *Phocomelus* höchstens nur 0,2 cm, im ersten Falle ein Verhältnifs des Knochens zu dem Epiphysenknorpel wie 2,5 : 1, im zweiten dagegen wie 0,09 : 1.

Hecker führte an gleicher Stelle noch ein anderes, *Buhl* gehöriges Exemplar von *Phocomelus* geringen Grades an, wo der Verknöcherungsprozefs nur am Hinterhaupt, Ober- und Unterkiefer in geringer Ausdehnung begonnen hatte, das ganze übrige Skelet aber rein knorpelig war. Demzufolge sagt *Hecker* vom *Phocomelus*: »er sei vielleicht als Endglied einer Reihe von Veränderungen zu betrachten, welche den Namen Rachitis foetalis verdienen.«

*Virchow**) bestreitet nicht die Möglichkeit, dafs die Rachitis ebenso beim Fötus wie extrauterin vorkommen könne, da in Bezug auf das Knochenwachsthum zwischen intra- und extrauteriner Entwicklung kein Unterschied gemacht werden könne; nach ihm wäre dann die zu geringe Abgabe von Verkalkungsmaterial aus dem mütterlichen Blute die Ursache der fötalen Rachitis.

Bei der Rachitis findet aber nicht blofs ein Mangel an Ablagerung von Verkalkungsmaterial statt, sondern auch ein anderer Procefs**). Die Knorpelsubstanz, welche sich

*) Archiv für pathol. An. Bd. 5. Das normale Knochenwachsthum und die rachitische Störung desselben.

**) Rindfleisch, pathol. Gewbl. § 626—635.

in normalen Verhältnissen sehr rasch in Knochengewebe umbildet, häuft sich bei Rachitis durch fortgesetzte Theilung der Knorpelzellen*) immermehr an, so daß die Verknöcherung damit nicht mehr Schritt halten kann. Daraus entstehen die charakteristischen Auftreibungen bei Rachitis, die Epiphyfenwülste. Ist nun die Rachitis eine acquirirte, so führt sie zu den sogenannten Säbelbeinen, (*genu varum*), ist sie aber eine foetale, so muß das Längenwachsthum der Extremitätenknochen sehr darunter leiden und dafür eher ein Dickenwachsthum der Epiphyfenknorpeln eintreten, wie es Heckers Durchschnitt des Oberschenkels zeigt.

Bei den beiden zuerst beschriebenen Fällen (Präparat 19 und 140) ist Hydrocephalus als Ursache anzunehmen, besonders aber bei dem in geburtshilflicher Hinsicht erwähnten Fall (Präparat 192), dessen durchschnittene Extremitäten eine ganz normale Ossifikation aufweisen.

Dagegen verhält sich das dritte beschriebene Exemplar (Präparat 230) in Bezug auf den humerus gerade so, wie das von Hecker beschriebene (Präp. 32) in Bezug auf den Femur. Der humerus mißt nicht mehr als 1 cm; er ist durch und durch knorplich; eine Verknöcherungsbrücke ist gar nicht vorhanden, in der Mitte ist sogar eine Continuitätstrennung, so daß er eigentlich aus 2 Stücken besteht, aus dem 2 mm. im Diameter messenden *caput humeri*, an dem sich nur noch 1 mm. Epiphyfenknorpel ansetzt, und aus dem unteren 7 mm. langen, 4 mm. breiten Theile. Ulna und Radius sind in Form ziemlich wohlgebildet, haben eine Länge von 2 cm., wovon die Hälfte auf die knöcherne Diaphyse trifft. Diese hat einen Durchmesser

*) Nach den Untersuchungen G. Wegener's (*Virchow's Archiv*, Bd. LVI pag. 2) läßt sich durch Monate lang fortgesetzte sehr kleine Gaben Phosphor bei Thieren (besonders Kälbern) rachitische Knochenveränderung künstlich erzeugen, wonach Rindfleisch vermuthet, daß es sich auch bei der nicht artificiellen Rachitis um einen chemischen Reiz handeln möchte.

von 2 mm., die Epiphyfen dagegen nicht ganz 4 mm. Das Ellenbogengelenk stellt im Durchschnitt eine gerade Linie dar. Metacarpus und Phalangen der Finger sind etwas verknöchert.

Die unteren Extremitäten sind, wie schon früher erwähnt, im Verhältniß zu den oberen nur unbedeutend verkürzt. Ein Durchschnitt läßt den nur 3 mm. dicken, aber 7 cm. langen Femur bis auf Condyl. ext. und int. ganz officirt finden. Das caput femoris ist spongiös. Das Periost ist sehr verdickt und läßt sich mit Leichtigkeit vom Knochen entfernen. Die Weichtheile des 3 cm. dicken Oberschenkels bestehen größtentheils aus Fett, nur sehr dünne Muskelschichten sind eingelagert.

Der Unterschenkel weist nur eine 5 cm. lange, 3 mm. dicke, ganz knöcherne Tibia auf, die Fibula fehlt. Auch hier ist das Periost sehr verdickt und leicht abschälbar und viel Fett in der Umgebung, Tarsus, Metatarsus und die Phalangen der Zehen sind fast ganz knorplich.

Kann man nun bei einer solchen Beschaffenheit des Femur und der Tibia auch Rachitis ätiologisch annehmen, oder ist es ein anderer Prozeß, der ihre genannten Eigenschaften bedingt?

Das Dickenwachsthum der Knochen*), die fortwährende Anbildung von compakter Substanz an der Peripherie hat stets eine Resorption an der der Markhöhle zugewendeten Seite im Gefolge. Resorption im Innern und Apposition von Außen hält sich in normalen Verhältnissen die Waagschale. Bei Rachitis aber wird die peripherische Apposition von compakter Substanz unterbrochen, während die Resorption im Innern gerade wie beim normalen Knochenwachsthum vor sich geht.

Eine zu bedeutende Resorption im Innern nicht bloß der compacten Substanz allein, sondern auch des Markes selbst, wodurch die peripheren Theile sich näherten, wird

*) Rindfleisch, path. Gewbl. p. 508.

auch im vorliegenden Falle den geringen Umfang des Femur und der Tibia bewirkt haben. Dafs nebenbei auch ein Wucherungsprocess des Knorpels stattgefunden zeigen die noch restirenden proportional zu grofsen Condylen; doch überwog im Ganzen genommen die Resorption im Innern. Auch spricht die knorpliche Beschaffenheit des Metatarsus und der Phalangen für Mangel an Verkalkungsmaterial, das Ganze somit für Rachitis, welche wohl in genanntem Falle auch als Ursache der Phocomelie anzunehmen ist.

Die in hiesiger Sammlung vorhandenen Fälle von Phocomelus, deren im Ganzen 6 sind, welche Zahl im Allgemeinen darauf schliesen läfst, dafs die Phocomelie keine seltene Mißbildung ist, lassen sich theils auf Hydrocephalie, theils auf fötale Rachitis zurückführen.

Manchmal ist Phocomelie in Verbindung mit der von *Vrolik**) zuerst so genannten »Osteogenesis imperfecta«, sei es nun, dafs man sie im Sinne *Vroliks* versteht, wobei der Schädel ein Aussehen hat, als wenn er aus vielen Worm'schen Knochen zusammengesetzt wäre, als auch mit Hecker, welcher hauptsächlich die andere Form, wofür *Vrolik* noch den Namen Rachitis congenita gebraucht (Fall Sandifort) und welche in besonderer Weichheit der Knochen besteht, als Ost. imperf. bezeichnet wissen will im Gegensatz zu Rachitis foetalis, so dürfte man in beider Beziehung die Ursache, vorausgesetzt, dafs eben Phocomelie vorhanden, wiederum in Hydrocephalie finden; *Vrolik* selbst macht seine Ost. imp. von Hydrocephalie als am wahrscheinlichsten abhängig («verosimiliter per hydrocephalum») und beim Falle Sandiforts lag wirklich Hydrocephalus vor; so zeigt auch unser erst beschriebener Phocomelus (Präp. 19) aufer Hydrocephalus noch die Erscheinungen der Ost. imp. (der Rachitis congenita *Vroliks*), ebenso der schon erwähnte Fall Bordenave's.

*) Tab. ad. ill. embr. XCI.

Vielleicht ist der Unterschied der Ost. imp. letzteren Sinnes von der Rachitis foetalis allein darin zu suchen, daß bei der ersteren keine Wucherung, keine vermehrte Theilung der Knorpelzellen stattfindet wie bei der ächten Rachitis, daß der wahrscheinlich zu Grunde liegende Hydrocephalus nicht bloß die normale Entwicklung der Knochen selbst, sondern sogar das Wachsthum der Knorpel zu hindern vermöge, wodurch es dann auch zu Phocomelus kommen könne.

Eine andere Ursache als Hydrocephalus und Rachitis könnte man anzunehmen geneigt sein, bei einem einzig in der Literatur stehenden Beispiele, wo nach *Flachsland**) eine Mutter dreimal hintereinander innerhalb 3 Jahren immer phocomelische Kinder, und zwar von derselben Form gebär, denen Vorderarm und Unterschenkel durchaus fehlten, während die Hände und Füße ganz normal gebildet waren; ebenso waren Kopf, Brust und Unterleib wohlgeformt. Leider erwähnt *Flachsland* nichts über die Consistenz der Knochen der Früchte. Hydrocephalus wenigstens wird wegen der als normal angegebenen Form des Kopfes nicht vorhanden gewesen sein. Ebenso führt *Flachsland* nichts über den Körperbau der Mutter an; gewiß aber hätte er es erwähnt, wenn die Mutter (und höchst wahrscheinlich auch, wenn der Vater) phocomelisch gewesen wäre, so daß man doch dieses ausschließen kann, wonach man auch an keine erbliche Uebertragung von Seiten der Mutter oder des Vaters auf die jeweilige Frucht denken darf. Gerade dieser Fall wäre geeignet, über die Aetiologie der Phocomelie genaueren Aufschluß zu geben, wenn, wie gesagt, die näheren Umstände bekannt wären. Man kann hier immer noch annehmen, daß jede Frucht an fötaler Rachitis laborirte und darauf die Phocomelie zurückführen. Aber wäre es nicht möglich, daß hier der wahre Grund

*) Obs. path. anat. p. 44. Raftadt 1800.

im Generationsapparate der Mutter, in der Beschaffenheit des Uterus, etwa gar in einer zu geringen Weite des Cavum uteri liege? Diefs führte zu einer mechanischen Auffassung.

Läfst es sich denken, dafs im zweiten Monate des Embryonallebens durch eine zu enge Gebärmutterhöhle und durch irgendwelche Wülste und Hervorragungen der Uterinsubstanz ein derartiger Druck auf den Embryo ausgeübt werde könne, dafs die Entwicklung seiner Extremitäten gehindert wäre? Diefs wäre nur dann allenfalls möglich, wenn der Embryo nicht in den Eihüllen steckte und durch Fruchtwasser gegen Druck von Seiten der Uterinwand geschützt wäre; ein vermehrter intraovularer Druck aber würde zu Berstung der Eihüllen und damit zu Abortus führen.

Sehen wir uns um irgend eine andere mechanische Urfache um. *Haller*, der für eine Menge von Mißbildungen die Unmöglichkeit einer mechanischen Erklärung beweist, ist im Gegentheil nicht blofs bei vollständigem Defekt einer Extremität und bei Mangel einer Hand oder eines Fusses, sondern auch bei Verkürzung der Extremitäten geneigt, eine mechanische Urfache anzunehmen. Er führt alle Extremitätenfehler durch Defekt in seiner physiologischen Abhandlung auf unter dem Titel »Partes destructae«; *) durch irgend welchen Druck, durch Obliteration einer Ernährungsader, auch wieder in Folge eines Druckes, könne ein Entwicklungsfehler der Extremitäten hervorgeufen werden. Zum Beweis sagt er unter Anderm »Et confusio musculorum, qui truncatis in artubus supersunt, vim casus confirmat, dum aliqui in eodem corpusculo musculi integri superfuerunt.«

Eine mechanische Urfache wäre noch die Einschnürung der sich abnorm um den Embryo legenden Nabelschnur; ist

*) *Haller*, operum anatomici argumenti minorum Tomus tertius Laufannae 1768. p. 148.

aber als Urfachie bei Phocomelie schon fast undenkbar, sobald diese nur in den oberen oder unteren Extremitäten symmetrisch angebildet; alle Wahrscheinlichkeit verliert sie aber, wenn alle 4 Extremitäten phocomelisch betroffen werden und noch dazu dreimal hintereinander bei Kindern von ein und derselben Mutter, wie im Falle *Flachsland's*; das Gleiche gilt hier auch für die mechanischen Momente, welche *Haller* anführt.

Somit werden wir der Wirklichkeit am nächsten gekommen sein, wenn wir annehmen, die Phocomelie jener drei Kinder hätte auf Rachitis basirt.

Da nun, wie oben dargethan, Hydrocephalus und Rachitis von einander getrennt Phocomelie hervorrufen können, so ist damit gezeigt, daß Phocomelie nicht durch eine Urfachie allein entstehen könne, sondern daß sie vorderhand wenigstens durch 2 ätiologische Bedingungen ermöglicht wird.

Etwas Anderes noch ergibt sich aus der vorliegenden Darstellung: nämlich, daß man nicht, wenigstens nicht wenn man vom ätiologischen Standpunkt ausgeht, wie *Förster* nach der äußeren Erscheinung, den Phocomelus eine Form des Peromelus nennt; Defekte von Händen oder Füßen, welche *Förster* hauptsächlich unter Peromelus versteht, können auch infolge von Ab schnürungen durch die Nabelschnur, wie man mit voller Berechtigung und durch Thatfachen unterstützt annimmt, erzeugt werden. Ein derartiges mechanisches Causalmoment des Phocomelus aber wurde oben negirt.

Hingegen wieder läßt sich vom ätiologischen Standpunkte aus kein rechter Unterschied zwischen Phocomelus und Micromelus machen, bei welchem letzterem die Extremitäten dem äußeren Ansehen nach wohlgebildet, aber abnorm klein sind. Schon der Form nach ist es oft schwierig zu beurtheilen, ob man eine Mißgeburt Phocomelus oder Micromelus nennen soll, außer man fixirt die Begriffe in

der Weife, dafs man bei Phocomelus wenigftens äufserlich kein Ellenbogen- oder Kniegelenk annimmt, deren jedes hingegen beim Micromelus immer vorhanden fein mufs. Wie vielleicht einige Fälle in obiger Abhandlung zeigen, ift ein derartig ftrenger Unterfchied nicht feftgehalten worden.

Betreffs der Erbllichkeit der Phocomelie wurde fchon oben erwähnt, dafs fich kein derartiger Fall in der Literatur vorfindet.

Dafs Zwillingephocomelus vorkommen, wurde auch fchon durch einen Fall (*Walter's*) erwiefen.

Nach *Rokitansky**) find von Mifsbildungen überhaupt weibliche häufiger als männliche, was wohl auch vom Phocomelus gelten dürfte.

Die Möglichkeit des Vorkommens von mehreren Phocomelus hintereinander bei ein und derselben Mutter erwies der Fall *Flachslan'd's*.

Zum Schlufse noch drängt es mich, Herrn Obermedicinalrath *Prof. Dr. v. Hecker* meinen tiefgefühlten Dank auszusprechen für die gütige Ueberlaffung des Materials und die freundliche Unterweifung, was zufammen mir ein genaueres Eingehen auf den Gegenstand meiner Abhandlung ermöglichte.

*) Lehrb. d. path. Anat. Wien 1855 S. 21.

